

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА ЖИВОТНЫХ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЯЩУР

Ящур – опасная остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь парнокопытных, а также мозолоногих животных, характеризующаяся лихорадкой, слюнотечением, афтозно-эрозийными поражениями слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи носового зеркала, конечностей, молочных желез, миокардитом и миозитом при высокой смертности молодняка первых дней жизни. Ящуром от животных может заразиться и человек.

Возбудитель ящура – РНК-содержащий вирус, семейства Пикорнавиридэ, рода Афтовирис. Существует 7 типов вируса О, А, С, САТ-1, САТ-2, САТ-3 и Азия-1. Животные, переболевшие вирусом одного типа, могут заболеть ящуром, вызванным вирусом другого типа.

Источник болезни – больные, переболевшие животные, а также находящиеся в инкубационном периоде болезни, который длится до 14 дней. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями. Передача вируса осуществляется воздушно-капельным, контактным, алиментарным и ятрогенными путями. Факторы передачи вируса – продукция животного происхождения, корма, вода, подстилка, предметы ухода за животными, одежда и обувь персонала, транспорт, контаминированные вирусом. Инфицированные вирусом ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки и др. могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров.

Клинические признаки ящура:

При остром течении болезни – у крупного рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита, вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Далее – повышение температуры тела до 40,5-41,50 С, угнетение, отказ от корма, прекращение жвачки. На 2-3 день на внутренней поверхности нижней и верхней губ, на беззубом крае нижней челюсти, на языке и слизистой оболочке щек появляются афты, у некоторых животных – в межкопытцевой щели и на вымени. Через 12-24 часа стенки афт разрываются, образуются эрозии, в это время температура тела понижается до нормальной, наступает обильное слюнотечение.

У телят ящур протекает в безафтозной форме с явлениями острого гастроэнтерита.

У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в области межкопытцевой щели, венчика и мякишей появляются красные болезненные припухлости, затем афты, которые, разрываясь, образуют эрозии. Заболевание конечностей сопровождается хромотой, иногда спаданием копытца. Чаще афты появляются на пяточке, сосках и редко на слизистой ротовой полости. У взрослых свиней ящур длится 8-25 дней, у поросят-сосунов протекает в септической форме и в первые 2-3 дня болезнь вызывает гибель 60-80% животных.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ ЯЩУРА

Основной метод профилактики болезни — **ВАКЦИНАЦИЯ !**

В целях предотвращения возникновения и распространения ящура собственникам животных необходимо:

- не завозить из неблагополучных регионов животных, продукты животного происхождения корма и кормовые добавки;
- не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов;
- всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;
- оборудовать санитарными пропускниками, входными дезинфекционными барьерами места въездов (для с/х предприятий), дезинфекционными ковриками входы на территорию объектов хозяйства, обеспечить их регулярную заправку;
- обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить допуск посторонних лиц, заезд на территорию транспортных средств, не прошедших специальную обработку, завоз необработанного инвентаря и пр.;
- обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
- соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных;
- не допускать бродяжничества всех видов скота;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также животных, контактирующих с ними, обеспечить изоляцию трупов;
- по требованию ветеринарных специалистов, вакцинировать животных против ящура, систематически проводить ветеринарный осмотр с измерением температуры тела;

Обо всех случаях выявления животных с подозрением на ящур (афтозно-язвенные образования на слизистых оболочках языка, губ, десен, афты в межкопытной щели, на коже вымени) незамедлительно сообщать по телефонам:

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»:

(85141) 5-20-55, 5-16-03

416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Баумана, 35Б.